



Carex nigra, © hepia


Carex nigra (L.) Reichard

La laiche brune

Famille des Cyperacées

Statut CH : non menacé (LC), pas de priorité nationale (K)

Distribution altitudinale* :



Alpin
Sub-alpin
Montagnard
Collinéen


Ecologie : Les laiches sont caractérisées par leurs tiges pleines triangulaires et leurs feuilles linéaires, raides et souvent coupantes. La laiche brune (*Carex nigra*) est une espèce boréo-alpine*, bien qu'on puisse la rencontrer à tous les étages altitudinaux* en Suisse. Ses populations sont relativement stables et présentes dans les prairies marécageuses, les marais, les étangs et les tourbières. Seules les parties souterraines (racines et stolons*) survivent à l'hiver. La floraison a lieu de mai à juillet.

Comment la reconnaître : D'une hauteur comprise entre 10 et 50 centimètres, *Carex nigra* fait partie des laiches à épis* différenciés, ayant des épis mâles et femelles distincts sur la même tige. Il y a **4-6 épis dressés de 2-5 cm, directement attachés à la tige sans support** (voir figure ci-dessous) dont 1 à 2 épis mâles au sommet de la tige. **Les gaines basales** (la base de la feuille s'enroulant autour du début de la tige) **sont de couleur brune foncée à brune rougeâtre et non carénées***. La détermination nécessite de l'expérience.

Espèces proches :

- La laiche élevée (*C. elata*) forme généralement des touffes denses dont la gaine basale est brune jaunâtre, luisante et carénée (en forme de coque de bateau). Elle peut se trouver jusqu'à l'étage montagnard* ;
- la laiche à utricules* contractés en bec (*C. rostrata*) se distingue par des épis jaunes dont 2-4 épis mâles. Elle se rencontre habituellement jusqu'à l'étage sub-alpin*.

Epis sessiles* de *C. nigra*, avec un épi mâle (en bleu) et deux épis femelles (en rouge).



© hepia

Touffe dense de *C. elata*



© hepia

Epis « jaunes » de *C. rostrata*



© hepia

* : termes définis dans le glossaire

Carte de distribution suisse selon Info Flora

